


乳幼児期に受ける定期予防接種《参考例》

川越市

| 年齢（月齢） ワクチン | | 6週 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | 7か月 | 9か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 7歳 6か月 | 8歳 |
|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|----|----|----|----|-----------|----|
| B型肝炎 | | | ↓ | ↓ | | | ↓ | 3回目 1回目から139日以上の間隔をおいて接種 | | | | | | | | |
| 標準的には、生後2か月から生後9か月未満に3回接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタ | 1価 | | ↓ | ↓ | | | | 2回目 1回目から27日以上の間隔をおいて接種 | | | | | | | | |
| | 5価 | | ↓ | ↓ | ↓ | | | 3回目 1回目から27日以上の間隔をおいて接種 | | | | | | | | |
| ワクチンが2種類あり、接種時期と回数異なります。 ただし、いずれの場合でも初回の接種は14週6日までに行うこと。 (1価：生後6週0日～24週0日 5価：生後6週0日～36週0日) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒブ <small>※生後2か月から生後7か月未満に接種を開始した場合</small> | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | 初回（この場合、3回分を指します） 27日から56日の間隔をおいて3回接種 | 追加 初回終了後、7か月から13か月の間隔をおいて接種 | | | | | | | |
| 接種開始年齢によって、接種回数、接種間隔が異なります。詳しくは、説明書をお読みいただくか、予防接種担当にお問い合わせください。 (最大4回) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | 初回（この場合、3回分を指します） 27日以上の間隔をおいて3回接種 | 追加【生後12か月以降に接種】 初回終了後、60日以上の間隔をおいて12か月から15か月未満に接種 | | | | | | | |
| 四種混合 (ジフテリア・百日せき 破傷風・不活化ポリオ) | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | 1期初回 20日から56日の間隔をおいて3回接種 | 1期追加 1期初回終了後、12か月から18か月の間隔をおいて接種 | | | | | | | |
| BCG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準的には、生後5か月から生後8か月未満に接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん風しん混合 【MR】 | | | | | | | | 1期 | 1歳を過ぎたら早めに接種 | | | | | | 2期 | |
| 小学校就学前の1年間 ※該当年度の4月1日から3月31日までの間に接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘 (水ぼうそう) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準的には、1回目接種を生後12か月から生後15か月未満に開始 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生後6か月から接種できますが、標準的には、1期初回を3歳、1期追加を4歳に接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1期初回 6日から28日の間隔をおいて接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1期追加 1期初回終了後、おおむね1年の間隔をおいて接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |



対象年齢



標準的な接種期間

この表は、7歳6か月までに受ける定期予防接種の一例です。

接種を受ける前には、必ず説明書をお読みください。不明な点は、医師又は予防接種担当にお尋ねください。